

# Maggots



Die wasserlöslichen granulierten Maggots ist ein Wachstumsregulator zur Bekämpfung von Fliegenlarven. Es kann direkt auf den Mist, die Schwimmdecken oder die Einstreu gestreut oder in Wasser gelöst gegossen oder gesprüht werden. Die Wirkung hält bis zu 6 Wochen an. Maggots eignet sich für den Einsatz in unterschiedlichsten Situationen. Vor allem in Milch- und Kälberbetrieben, Mast- und Schweinezuchtbetrieben, Geflügelbetrieben, Schaf- und Ziegenställen, Pferdestallungen, Mülldeponien und Müllbehältern entfaltet Maggots seine Wirkung.

## Einsatzempfehlung

Maggots kann durch Trockenstreuen oder Auflösen und Aufsprühen oder Giessen angewendet werden.

- Die Art der Anwendung hängt von der Feuchtigkeit des Mistes ab. Das Produkt wird bei sehr feuchtem Mist, wie z.B. in Gruben sowie Schwemmkanälen (Schweine, Milchvieh) trocken ausgestreut. Bei trockenem Mist, wie z.B. Tiefstreu, strohareichem Mist, Kotgruben beim Geflügel wird Maggots durch Sprühen oder Giessen ausgebracht.
- Das empfohlene Behandlungsintervall hängt von den Bewirtschaftungs- und Haltungssystemen sowie den klimatischen Bedingungen ab. Es kann von 2-3 Wochen bis zu mehreren Monaten variieren.
- Generell wird empfohlen, die Behandlung nach jeder Entmistung (Tiefstreu) oder nach dem Ausräumen der Grube oder beim Auffinden von Fliegenlarven (andere Tierhaltungssysteme) zu wiederholen.
- Kombinieren Sie den Einsatz von Maggots (Larvizid) mit einem Fliegen-Adultizid wie Twenty One und Sheila, um eine vollständige Kontrolle der Fliegen zu gewährleisten.

## Dosierung



### Trockenstreuerung

- 250 g Maggots auf 10 m<sup>2</sup> ausstreuen.



### Sprühen

- 250 g Maggots in 1-4 Liter Wasser auflösen und auf 10 m<sup>2</sup> ausbringen.



### Giessen

- 250 g Maggots in 10 Liter Wasser auflösen und auf 10 m<sup>2</sup> ausbringen.



### ART DER FORMULIERUNG

Wasserlösliches Granulat

### WIRKSTOFF

Cyromazin 2%

### CHEMISCHE EINTEILUNG

Triazin

### WIRKUNGSMECHANISMUS

Cyromazin stört den Chitinstoffwechsel des Insekts. Dies führt zu einem verzögerten Larvenwachstum, unterbricht die Häutung und verhindert die normale Larvenentwicklung sowie die Verpuppung. Behandelte Larven häuten sich nicht zum nächsten Stadium. Somit wird der Zyklus der Fliege unterbrochen.


### EINSATZZIEL

Fliegenlarven

### VERPACKUNGSEINHEITEN

5 kg, 25 kg

Cyromazin



SAHLI AG  
Oberdorfstrasse 17  
CH-8934 Knonau  
www.sahli-ag.ch

